

Identificação do paciente

Nome: _____ Idade: _____

Data de Nascimento: ____/____/____ Assinatura: _____

Obs.: No caso de impossibilidade de o paciente assinar, preencher os dados do Representante ou Responsável Legal.

Representante ou Responsável Legal

Nome: _____ Idade: _____

Data de Nascimento: ____/____/____ Assinatura: _____

Procedimento realizado::

[] Coronariografia – Cateterismo Cardíaco - Realizado em ____/____/____

[] Angioplastia Coronariana com implante -

Stent Realizado em ____/____/____

[] Arteriografias Periféricas - Realizado em ____/____/____

COLE A ETIQUETA AQUI

[] PROCEDIMENTO POR VIA RADIAL (PUNHO)

- Não movimentar ou fletir o punho por 24 horas após a instalação do curativo;
 - O curativo do punho é do tipo compressivo e pode incomodar um pouco no início. Deverá ser mantido por 24 horas, e a partir desse período poderá ser retirado e substituído por um curativo tipo “band-aid”;
 - Considera-se normal que a mão fique um pouco inchada, com uma coloração levemente violácea e com alguma sensação de formigamento nas primeiras horas;
 - Evitar realizar esforço com o braço, não pegar peso, nos 3 dias subsequentes ao procedimento;
 - Dirigir somente após o período de três dias;
 - Se houver sangramento, dor excessiva, hematoma no local da punção ou qualquer outra dúvida, entre em contato com o Médico Assistente/Equipe Médica do Hospital Di Camp, observando as seguintes recomendações sobre alguns medicamentos especiais:
 - **Metformina:** Deve ser reiniciada somente 48 horas após o procedimento.
- Os demais hipoglicemiantes orais podem ser reiniciados no mesmo dia.
- **Insulina:** Seguir conforme orientação médica;
 - **Anticoagulantes:** Contactar equipe médica do Hospital Di Camp ou Médico Assistente.
 - Cumarínicos: Marevan, Coumadin
 - DOACs: Rivaroxabana (Xarelto, Rivaxa), Apixabana (Eliquis), Edoxabana (Lixiana), Dabigatrana (Pradaxa).

[] PROCEDIMENTO POR VIA FEMORAL (VIRILHA)

- Manter a perna imóvel durante o período de observação no Hospital (em média 24 horas), sendo liberado caminhada após esse período;
- **Cabeceira do leito hospitalar** elevada no máximo até 30 graus;
- Curativo local é do tipo compressivo, inicialmente pode incomodar um pouco, e **deverá ser mantido por 24 horas**; Poderá ser retirado com uso de Soro Fisiológico (no hospital) ou água corrente durante o banho no ambiente domiciliar, quando então poderá ser substituído por curativo tipo “band-aid”;
- No primeiro dia após retirada do curativo, caminhar apenas no nível plano, e manter repouso em sua residência ou ambiente hospitalar;
- Evitar esforço físico: Caminhadas longas ou subir/descer escadas somente 7 dias após procedimento;
- Dirigir **somente após o período de 3 dias** do procedimento.