

COLE A ETIQUETA AQUI

Nome completo: _____

Data de Nascimento: ____/____/____ Data: ____/____/____ Leito: _____

Término Da Cirurgia: ____:____ Início Da Anestesia: ____:____ Término Da Anestesia: ____:____

GERENCIAMENTO DE RISCOS INDIVIDUALIZADO

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Risco Para Dor | ☐ Risco Para Nutrição Inadequada | ☐ Risco Para Risco Para Perfusão Renal Ineficaz |
| ☐ Risco Para IPCS | ☐ Risco Para Lesão De Córnea | ☐ Risco Para Desorientação |
| ☐ Risco Para Flebite | ☐ Risco Para Lesão Aguda De Mucosa Gástrica | ☐ Risco Para Sangramento |
| ☐ Risco Para PAV | ☐ Risco Para Desequilíbrio De Volume | ☐ Risco Para TEV |
| ☐ Risco Para Broncoaspiração | ☐ Risco Para Desequilíbrio Eletrolítico | ☐ Risco Para Débito Cardíaco Diminuído |
| ☐ Risco Para Glicemia Instável | ☐ Risco Para Mobilidade Física Prejudicada | ☐ Risco Para Perfusão Cardíaca Diminuída |
| ☐ Risco Para ITU Associada Ao CVD | ☐ Risco Para Queda (Morse ____) | ☐ Prevenção Respiratória |
| ☐ Risco Para LPP (Braden ____) | ☐ Risco Para Desposicionamento De Dispositivos Médicos | ☐ Prevenção De Contato |
| ☐ Risco Para Infecção | ☐ Risco Para Desequilíbrio Na Temperatura | ☐ Prevenção Aérea |
| ☐ Risco Para Náuseas | ☐ Risco Para Perfusão Tissular Periférica Ineficaz | |
| ☐ Risco Para Diarréia | ☐ Risco Para Padrão Respiratório Ineficaz | |
| ☐ Risco Para Constipação | ☐ Risco Para Resposta Ineficaz Ao Desmame De VM | |

ALERGIAS

CONDUTA

INTERVALO

APRAZAMENTO

1 - Observar e registrar nível de consciência na primeira hora

15/15 min

2 - Observar e registrar nível de consciência na segunda hora

30/30 min

3 - Observar e registrar nível de consciência na terceira hora

1/1h

4 - Observar e registrar nível de consciência – a partir da 4ª hora

4/4h

5 - Aferir e registrar FC,FR,PA e Temperatura nas primeiras 4 horas

1/1h

6 - Aferir e registrar FC,FR,PA e Temperatura a partir da 4ª hora

4/4h

7 - Avaliar intensidade e localização de dor, segundo escala de EVA

Admissão e 4/4h

8 - Mensurar débito urinário em pacientes com CVD nas primeiras 4 horas

1/1h

9 - Mensurar débito urinário em pacientes com CVD a partir da 4ª hora

4/4h

CUIDADOS GERAIS

10 – Avaliar necessidade de cateterismo vesical de alívio	Nas 24 horas	
11 – Estratificar e sinalizar em impressos o Risco de Queda e Lesão cutânea	Admissão	
12 – Inspeccionar incisão cirúrgica quanto: sangramento, drenagem, deiscência e sinais flogísticos	Nas 24 horas	
13 – Atentar para presença de drenos, volume e características das drenagens	Nas 24 horas	
14 - Atentar para queixas de náuseas e vômitos	Nas 24 horas	
15 – Atentar para liberação da dieta e comunicar ao serviço de Nutrição	Atenção	
16 – Estimular a deambulação assim que liberado	Atenção	
16 – Realizar curativo conforme orientação do médico auxiliar ou GAIP	Atenção	

Assinatura/Carimbo Centro Cirúrgico_____
Assinatura/Carimbo Enfermeiro_____
Assinatura/Carimbo Téc. De Enfermagem