

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA UTILIZAÇÃO DO GUIA

As Interações Farmacêuticas também conhecidas como incompatibilidades são aquelas que ocorrem fora do paciente, ou seja, quando se misturam medicamentos na mesma seringa, equipo de soro (via Y) ou outros recipientes. Essas interações podem resultar em mudanças nas características organolépticas que são caracterizadas por alteração de cor, opalescência, turvação, formação de cristais, floculação, precipitação, associadas ou não a mudança de atividade farmacológica, diminuição ou inativação de atividade de um ou de ambos os fármacos, formação de novos compostos e intoxicação por um ou ambos os medicamentos. Este tipo de interação representa cerca de 5% a 15% dos erros de medicamentos.^{1,2}

Assim para a utilização deste guia sempre seguir os seguintes passos:

^{1º} Sempre que possível, evitar a mistura de medicamentos em qualquer recipiente, seja ele seringa, equipo de soro, equipo via Y e outros;

^{2º} Caso a mistura de medicamento não possa ser evitada, use o guia para verificar a compatibilidade entre os fármacos.

Nome comercial:	Medicamentos:	Incompatibilidades:
Antropion ®	Atropina	Não associar com outros medicamentos.
Ancoron ®	Amiodarona, 50 mg/ ml	Não associar com outros medicamentos.
Bezentacil ®	Benzilpenicilina, benzatina, 1.200.000 UI, injetável	Não associar com outros medicamentos.
Diprosan ®	Betametasona, dipropionato, associada à betametasona fosfato, injetável – 1mL	Não associar com outros medicamentos.
Digesan®	Bromoprida, solução injetável 10 mg/2 ml	Não associar com outros medicamentos.
Profenid IM ®	Cetoprofeno, intramuscular 100 mg/ ml	Não associar com outros medicamentos.
Profenid IV ®	Cetoprofeno, 100mg, pó líofilo p/ injetável, endovenoso	Não associar com outros medicamentos.
Cloreto de Potássio 10%	Cloreto de Potássio 10%	Não associar com outros medicamentos.
Cloreto de sódio 20 %	Cloreto de sódio 20 %	Não associar com outros medicamentos.
Decadron IV ®	Dexametasona 4mg/mL, solução injetável – 2,5mL	Não associar com outros medicamentos.
Voltaren IV ®	Diclofenaco Sódico 25mg/mL, solução injetável – 3ml	Não associar com outros medicamentos.
Dramin IV ®	Dimenidrinato, associado com Piridoxina + Glicose + Frutose, 3mg + 5mg + 100mg + 100mg/mL, 10 ml	Diazepam, Dipirona, Dobutamina, Dopamina, Epinefrina, Gentamicina, Meperidina, Metoclopramida, Morfina
Uni diazepaz®	Diazepam amp	Não associar com outros medicamentos.

Dramin IM ®	Dimenidrinato, associado com Piridoxina cloridrato, 50mg + 50mg/mL, solução injetável – 1mL	Não associar com outros medicamentos .
Novalgina®	Dipirona Sódica 500mg/mL, solução injetável – 2mL	A solução de Dipirona Sódica não deve ser administrada juntamente com outros medicamentos injetáveis
Epifrin®	Epinefrina, 1mg/mL, solução injetável – 1mL*	Não associar com outros medicamentos.
Buscopan®	Escopolamina butilbrometo, 20mg/mL, solução injetável – 1mL	Não associar com outros medicamentos na mesma seringa/solução
Buscopan composto ®	Escopolamina butilbrometo, associada com dipirona sódica, 4mg + 500mg/mL, solução injetável – 5mL	Não associar com outros medicamentos.
Hidantal ®	Fenitoína sódica	Não associar com outros medicamento
Lasix ®	Furosemida, 10mg/mL, solução injetável – 2mL	Diazepam, Dobutamina, Dopamina, Epinefrina, Morfina
Fentanest ®	Fentanil	A administração simultânea de Citrato de Fentanila e Midazolam intravenoso resulta em aumento da meia-vida plasmática terminal e redução da depuração plasmática do Midazolam. Quando esses medicamentos são administrados concomitantemente ao Citrato de Fentanila, pode ser necessário reduzir a sua dose.
-	Glicose 25% e 50%	Não associar com outros medicamentos na mesma seringa/solução
-	Gliconato de cálcio 10%	Não associar com outros medicamentos na mesma seringa/solução
Haldol ®	Haloperidol, 5mg/mL, solução injetável – 1mL	Não associar com outros medicamentos na mesma seringa/solução
Glicort ®	Hidrocortisona, sal acetato, 100mg, pó liófilo p/ injetável	Ampicilina, Diazepam, Dimenidrinato, Fenitoína, Fenobarbital, Heparina, Benzilpenicilina Potássica e Procaína, Prometazina, Vitaminas B
Glicort ®	Hidrocortisona, sal acetato, 500mg, pó liófilo p/ injetável	Ampicilina, Diazepam, Dimenidrinato, Fenitoína, Fenobarbital, Heparina, Benzilpenicilina Potássica e Procaína, Prometazina, Vitaminas B
Dimorf ®	Morfina 10 mg solução injetável	Fisicamente incompatíveis: Aminofilina, Bicarbonato de Sódio, Fenitoína, Fenobarbital, Heparina, Petidina; Turvação: Haloperidol, Prometazina, Ampicilina, Diazepam, Fenitoína, Insulina

		Regular; Heparina Precipitado: Furosemida,
Plasil ®	Metoclopramida, cloridrato, 10mg/2 mL, solução injetável	Turvação: Benzilpenicilina Potássica, Bicarbonato de Sódio, Ampicilina, Haloperidol, Fenitoína; Precipitado: Furosemida, Gliconato de Sódio; Formação de gás após mistura: Bicarbonato de Sódio
Fenergan ®	Prometazina cloridrato, 25mg/mL, solução injetável - 2mL	Não associar com outros medicamentos na mesma seringa/solução
Dormonid®	Midazolam 15 mg	Precipitado: Ranitidina, Hidrocortisona; Turvação: Ampicilina, Diazepam, Fenitoína, Fenobarbital, Haloperidol, Insulina Regular; Precipitado e turvação: Aminofilina, Heparina, Bicarbonato de Sódio, Furosemida; Cristalização, precipitado, turvação: Dexametasona Formação de partículas: Dobutamina
Tilatil ®	Tenoxicam 20 mg e 40 mg	Não associar com outros medicamentos
Tramal ®	Tramadol 50 mg e 100 mg	Não associar com outros medicamentos na mesma seringa/solução